

# DIFERENCIAS EN LA PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA A PACIENTES CON ARTRITIS DE RECIÉN COMIENZO: ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

## Objetivo


Analizar, con perspectiva de género, potenciales diferencias por sexo en la prescripción farmacológica a los pacientes con artritis de reciente comienzo (ARC).

## Métodos


Estudio retrospectivo sobre el uso de FAME y GC en la consulta de ARC entre 2001 y 2023. Los datos demográficos, clínicos, analíticos y de tratamiento, incluyendo razones de suspensión y dosis, se recogen de forma protocolizada en las visitas basal, 6, 12, 24 y 60 meses de seguimiento. Solo se incluyeron los pacientes que cumplían criterios de artritis reumatoide o artritis indiferenciadas (AI).

## Resultados

### Descripción de la población



### Actividad y prescripción de terapia



## Conclusiones

- Se detectaron diferencias por sexo en el uso de algunos FAMES y GC, que no pueden explicarse sólo por el grado de actividad, discapacidad o las causas de suspensión de los fármacos.
- El mayor uso de terapia combinada o biológicos en las mujeres podría deberse al uso de DAS28VSG, un índice con sesgos de género que puede magnificar actividad.
- Aun cuando las dosis de GC en varones podrían explicarse por un mayor IMC, es posible que las mujeres más jóvenes sean más reacias a su uso, pese a mayor discapacidad.