

Juan José Bethencourt Baute<sup>1</sup>, Lucía Otero-Varela<sup>2</sup>, Andrea Zacarias Crovato<sup>3</sup>, Mireia López Corbeto<sup>4</sup>, Juan Carlos Nieto González<sup>5</sup>, Alina Boteanu<sup>6</sup>, Sergio Machín García<sup>7</sup>, Marta Medrano San Ildefonso<sup>8</sup>, Gisela Díaz-Cordovés Rego<sup>9</sup>, Carmen López Martín<sup>10</sup>, Lorena Expósito Pérez<sup>1</sup>, Samuel Hernández Baldizón<sup>11</sup>, Eugenia Enríquez Merayo<sup>12</sup>, Pilar Bernabeu González<sup>13</sup>, Raúl Veroz González<sup>14</sup>, Olaia Fernández Berrizbeitia<sup>15</sup>, Vicenç Torrente Segarra<sup>16</sup>, Sagrario Bustabad Reyes<sup>1</sup>

1Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. 2Unidad de investigación SER, Madrid. 3Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. 4Hospital Vall D'Hebron. Barcelona.5Hospital. Genral Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 6Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 7Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria. 8Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 9Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga. 10Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 11Hospital Universitario. Son Llatzer, Palma de Mallorca. 12Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid. 13Hospital Universitario de Alicante, Alicante. 14Hospital Universitario de Mérida, Mérida. 15Hospital Universitario de Basurto, Bilbao. 16Hospital Comarcal Alt Penedés Garraf, Barcelona

### Introducción

La artritis idiopática juvenil (AIJ) es la enfermedad reumática inflamatoria crónica más frecuente en la infancia. El manejo de los pacientes adultos jóvenes diagnosticados de AIJ no se encuentra todavía bien definido. Se han descrito cambios en la clasificación de los pacientes con AIJ en la edad adulta por indicaciones aprobadas para el uso de la terapia biológica, facilidad para la codificación en registros de adultos o simplemente error en la clasificación. Diferentes autores defienden que algunas categorías de AIJ se corresponden con el inicio pediátrico de enfermedades del adulto.

### Objetivos

Determinar si los pacientes diagnosticados de AIJ durante su etapa de transición a la consulta de adultos cumplen criterios de clasificación para enfermedades inflamatorias inmuno mediadas del adulto.

### Métodos

Estudio longitudinal, prospectivo y multicéntrico en el que se incluyeron pacientes del registro JUVENSER, correspondiente a la transición desde las unidades de reumatología pediátrica a la consulta de adultos. Se describen las categorías diagnósticas en la edad pediátrica (según la categoría International League of Associations for Rheumatology (ILAR)) y el grado de cumplimiento de criterios de clasificación en la edad adulta, al final del período de seguimiento.

### Conclusiones

- El **55,7%** de las AIJ durante su etapa de transición **no reunían criterios** que permitieran clasificarlas dentro de las enfermedades inflamatorias del adulto.
- Las formas de AIJ que cumplen criterios de clasificación de las enfermedades inflamatorias del adulto son las formas **poliarticulares factor reumatoide positiva, AIJ sistémica, la artritis psoriásica y la artritis relacionada con entesitis**, lo cual podría sugerir que estas formas se corresponden a un inicio pediátrico de las diferentes enfermedades.

### Resultado




Tabla 1 . Categoría ILAR al debut y clasificación de acuerdo con los criterios de las enfermedades inflamatorias del adulto

Categoría ILAR al debut		Enfermedad reumática de adulto en la última visita							
		AR	EA	APs	EspA Ind.	AE	E. Still	NC	NR
Oligoarticular persistente	193 (34.8)	1 (0.5)	0 (0.0)	6 (3.1)	5 (2.6)	1 (0.5)	0 (0.0)	165 (85.5)	15 (7.8)
Oligoarticular extendida	106 (19.1)	2 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (1.7)	1 (1.7)	50 (83.3)	5 (8.3)
Poliarticular seronegativa	75 (13.5)	21 (28.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.7)	1 (1.3)	49 (65.3)	2 (2.7)
Poliarticular seropositiva	60 (10.8)	27 (79.4)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (8.8)	3 (8.8)
Sistémica	35 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (65.5)	5 (17.2)	5 (17.2)
Artritis relacionada con entesitis	34 (6.1)	0 (0.0)	21 (19.8)	5 (4.7)	46 (43.4)	5 (4.7)	0 (0.0)	14 (13.2)	15 (14.2)
Artritis psoriásica	29 (5.2)	0 (0.0)	1 (2.9)	21 (60.0)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (22.9)	4 (11.4)
Artritis indiferenciada	23 (4.1)	1 (4.4)	0 (0.0)	1 (4.4)	5 (21.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (65.2)	1 (4.4)
Total	555	52 (9.4)	23 (4.1)	33 (6.0)	58 (10.5)	9 (1.6)	21 (3.8)	309 (55.7)	50 (9.0)

AR: artritis reumatoide, EA: espondiloartritis anquilosante, EspA Ind: espondiloartropatía indiferenciada, APs: artritis psoriásica, AE: artritis enteropática, E Still: enfermedad de Still, NC: no clasificable, NR: no reportado.